

डाळिंबातील खोड पोखरणारी अळी (कोएलोस्टर्ना स्पायनेटर) व्यवस्थापन सल्ला

डाळिंबातील खोड पोखरणारी अळी (कोएलोस्टर्ना स्पायनेटर: \pm सेरॅम्बीसीडी: ऑर्डर: कोलेओप्टेरा)

खोड पोखरणारी अळी एकेकाळी डाळिंबातील फार महत्वाची किड मानली जात नव्हती परंतु दिवसेंदिवस हया किडीचे \pm सेरॅम्बीसीडी बीटल, कोएलोस्टर्ना स्पायनेटर हया किडी सामान्यतः डाळिंब पिकामध्ये दिसून येतात. खोड पोखरणारी अळी सी.स्पायनेटर ही नाडाच्या खुंटावर किंवा फांदीवर \times पाहिले जाऊ शकते.

नुकसानीची लक्षणे:-



खोड किडयाची
† 0 0 † 0 0 0



\times पाहिले जाऊ शकते



\times पाहिले जाऊ शकते



\times पाहिले जाऊ शकते

व्यवस्थापन:-

कॉलोस्टर्ना/फिजीकल:-

- 1) नाडांना योग्य प्रमाणात अन्नद्रव्यांचा पुरवठा करावा ज्यामुळे अन्य किडींच्या प्रादुर्भावाने \pm अशक्त होणार नाही.
- 2) जुलै पासून ते सप्टेंबर पर्यंत अळी शोधून, रॉकेल मिश्रीत पाण्यात बुडवून मारावे.
- 3) छिद्रातील अळीचा छिद्रांमध्ये तार घुसवून नाश करावा.
- 4) पुर्वमानसुन किंवा बहार घेण्यापुर्वी वाळलेल्या \pm इंदया कापून नष्ट कराव्यात.
- 5) \pm लेल्या/खोदून काढलेल्या रोगग्रस्त \pm ढिग बागेजवळ ठेवू नये.
- 6) 200 \pm चे सोडियम दिवे शेतांत लावून किडींच्या पतंग अवस्थेला आकर्षित करून मारावे.

रासायनिक पद्धतीने व्यवस्थापन:-

- 1) खालील प्रमाणे पेस्ट तयार करून खोडावर लावावी.
10 लि. पाणी + ४ किलो लाल माती (गळी) + क्लोरोपायरिफॉस २० ई.सी. (२० एम.एल) + कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (२५ ग्रॅम) हे मिश्रण दोन \pm नाडाच्या खोडावर जमिनीपासून १-२ फुट उंची पर्यंत \pm
- 2) खोडावरील छिद्रांमध्ये डायक्लोरोव्हॉस ७६% ईसी हे ७०-८० \times \pm
- 3) डायक्लोरोव्हॉस \pm बाटलीच्या साहायाने खोडावरील छिद्रामध्ये, छिद्र पुर्ण भरेपर्यंत सोडावे व छिद्र चिखलाच्या साहायाने बंद करावे.