

## गारपीट व बेमोसमी पावसामुळे जुकसा झालेल्या डाळिंब पिकासाठी सल्ला

गारपीट व बेमोसमी पावसामुळे महाराष्ट्रात तसेच इतर राज्यात लाखो हेक्टर क्षेत्रावर अन्नधाय, भाजीपाला व फळपिकांचे अतोनात जुकसा झालेले आहे. बऱ्याच ठिकाणी १००% पर्यंत जुकसा झाल्याचे दिसु आले आहे कमी जुकसा झालेल्या ठिकाणी काही प्रमाणात फळझाडे वाचविणे शक्य आहे परंतु; काही ठिकाणी झालेल्या गारपीट व पावसामुळे ाभरा घिघण्यासारखे जुकसा झाले आहे. म्हणून डाळिंब पिकाचे - जुकसा विचारात घेता, परिस्थितीहाय खालील सल्ला देण्यात येत आहे.

अ. क्र.	जुकसा झालेली अवस्था	शिफारस/सल्ला
१.	सर्व फुटलेली फळे, चिरलेल्या फांदयासाठी :	सर्व फुटलेली / खराब झालेली फळे काढा ष्ट करावीत, तुटलेल्या फांदया छाट्टा काढा ष्ट कराव्यात.त्याचबरोबर १% बोर्डोमिश्रणाची फवारणी करावी. फांदया कापलेल्या ठिकाणी १०% बोर्डेक्स पेस्ट लावावी व पुढील बहारासाठी बाग विश्रांतीत सोडावी
२.	फळ तोडणीची अवस्था :	फळतोडणीपूर्वी बोरिक ॲसिड(२ग्रॅ/लि)ची फवारणी केल्यास संभाव्य फळकुज थांबविता येईल.त्याचबरोबर लवकरात लवकर फळे तोडून विक्रीस पाठवावीत.
३.	फळ तोडणीला एक महिा अवकाश असलेल्या अवस्थेत:	खालील शिफारस केलेल्या १ ते ३ क्रमांकाच्या फवारण्या कराव्यात.
४.	लिंबुच्या आकाराची फळे असताः अ) ७५% पेक्षा जास्त - जुकसा झालेल्या फळ बागाः  ब) २५% पेक्षा कमी - जुकसा झालेल्या फळ बागाः	बाग स्वच्छ करा पुढील बहाराच्या व्यवस्थापााची पुर्व तयारी करावी.(ऑगस्ट/सप्टें/ऑक्टो)  बाधीत फळे काढून ष्ट करावीत उर्वरित चांगल्या फळांच्या संरक्षणासाठी शिफारस केलेल्या १ ते ३ क्रमांकाच्या फवारण्या कराव्यात त्यांंतर एकात्मिक किड व रोग व्यवस्थापाकरिता वेळापत्रकाुसार फवारणीसाठी वापरावे.
५.	फुलधारा व फळधारोतील बागाः	बाधीत फुले/फळे काढून ष्ट करावीत िंतर शिफारस केलेल्या १ ते ३ क्रमांकाच्या फवारण्या कराव्यात अधिक फुल/फलधारणेसाठी वाट पहावी किंवा समाधाकारक फुल/फल धारणा असल्यास

		एकात्मिक किड व रोग व्यवस्थापाचे शेडयुल गरजेनुसार वापरावे.
६.	फलधारणा ऱसलेलेल्या बागाः	तुटलेल्या फांदया छाट्टा काट्टा ऱष्ट कराव्यात कापलेल्या ठिकाणी १०% बोर्डोपेस्ट लावावी १% बोर्डोमिश्रणाची फवारणी घेऊा ऱंतर गरजेनुसार ँकात्मिक किड व रोग व्यवस्थापाचे वेळापत्रक वापरावे.
७.	पााझड झालेलेल्या/विरळ प्रमाणात फळे असलेल्या बागाः	बागेमध्ये काही फळे असल्यास, शिफारस केलेली १ ते ३ फवारण्या कराव्यात, पाऊस झालेला ऱसल्यास बागेला ऱवीा फुट येण्यासाठी पाणी दयावे ;जेणेकरूा झ़ाडावर स्कॉर्चिंग होणार ऱाही.

### शिफारस केलेल्या ३ फवारण्या

- १) गारपीट झ़ाल्यांतर बोरिक ॲसिड (२ग्रॅ/लि) + झ़िंक सल्फेट (२.५ग्रॅ/लि) + कॅलशियम हायड्रॉक्साइड/चुा (१.२५ ग्रॅ/लि) +मॅकोझेब (२.५ ग्रॅ/लि)
- २) पहिल्या फवारणीच्या ँका आठवडयांतर युरिया (२.५-५ ग्रॅ/लि) + कार्बेडाझिम (१ ग्रॅ/लि)
- ३) दुसऱ्या फवारणीच्या १०-१२ दिवसांनी (चिलेटेड) सुक्ष्मअन्नद्रव्ये २-३ ग्रॅ/लि याप्रमाणे फवारावे.

### एकात्मिक किड व रोग व्यवस्थापा वेळापत्रक (आय डी आय पी ँम)

- १) विश्रांतीकाळात: आलट्टा पालट्टा १% बोर्डोमिश्रण किंवा २ब्रोमो रायट्रोप्रोपो १-३ डायोल .५ग्रॅ लिटर + कॉपर ॲक्सीक्लोराइड२.५ ग्रॅ / लिटर किंवा कॉपर हायड्राॲक्साइड यांची १०-१५ दिवसाच्या अंतराे आलट्टा पालट्टा फवारणी करावी.
- २) फलधारणा अवस्थेत: आलट्टा पालट्टा ०.५% बोर्डोमिश्रण किंवा स्ट्रेप्टोसायकलिा ०.५ग्रॅ/लिटर किंवा २ब्रोमो रायट्रोप्रोपो १-३ डायोल ०.५ग्रॅ लिटर + कॉपर ॲक्सीक्लोराइड२.५ ग्रॅ / लिटर किंवा कॉपर हायड्राॲक्साइड किंवा कार्बेडाझिंग १ग्रॅ/लिटर बुरशीजय ठिपक्यांच्या प्रादुर्भावाुसार आलट्टा पालट्टा फवारणी करावी.पावसाळयात ७ दिवसाच्या अंतराे फवारणी करावी आणि शुष्क वातावरणात १०-१५ दिवसाच्या अंतराे फवारणी करावी.आवश्यकता असल्यास योग्य किटक-ाशक मिसळूा फवारणी करावी.
- ३) ज्या बागांमध्ये तेलकट डाग रोगाचा प्रादुर्भाव ऱसेल त्याबागांमध्ये स्ट्रेप्टोसायकलिा ०.५ग्रॅ/लिटर किंवा २ब्रोमो रायट्रोप्रोपो १-३ डायोलची फवारणी करु ऱये.फक्त बुरशीाशकांसोबत किटक-ाशकांची फवारणी करावी.
- ४) शिफारस केलेल्या खतांच्या मात्रा हया झ़ाडाचे वय आणि अवस्था याुसार दयाव्यात.

**सुचाा:** बहाराुसार (आय डी आय पी ँम) फवारणीचे संक्षिप्त शेडयुल [www.nrcpomegranate.org](http://www.nrcpomegranate.org) या संकेतस्थळाच्या डाऊालोडस मध्ये पहावे.