

प्रति,
माननीय संचालक,
राष्ट्रीय डालीव संशोधन केंद्र सोलापूर.

विषय - सोलापूर लाल वाणावट्टल अनुभव

महोदय,

वरील विषयास अनुसरून मी केशव रमेश गायकवाड रा. माळेगाव, ता. माग, जि. सोलापूर, महाराष्ट्र. मी सोलापूर लाल रोपे लावल्यानंतर मला सोलापूर लाल वाणाविषयी सर्वांगीत वाटत की, मी ह्यागळ केल्यापासुन ता. 1 मार्च 2019 पहिले चार महिने फक्त झाडांना पारजोनुसार पाणी दिले. कोनतेही फवारणी घेतली नाही. किंवा औषधे सोडली नाहीत. चार महिने पुर्ण झाल्यानंतर 4 ऑगस्टला पहिली छाटणी केली. व मेसळ डोस रिंग पध्दतीने टाकुन त्यामध्ये 500 झाडांसाठी युरिया - 1 पोते, पोटॅश-1 पोते, DAP-1 पोते, मायक्रो न्युन-10kg असा रिंग डोस केला. रिंग डोस केल्यानंतर झाडांची क्रेश न वाढ व उरेदारक पण चोगला वाढला. पुन्हा दुसरी छाटणी 14 डिसेंबर 2019 ला केली व प्रति झाडास दोन पाटी रोगाखत व प्रति झाड 500g मेसळ डोस, व प्रति झाड 1kg निंबोळी टाकुन झाडांच्या ट्याडांना ड्रॅक्सने माली लावुन घेतली. व 1 जानेवारी 2020 ला पाणी खंद केले. व वाग तागावर सोडली. वाग तागावर सोडल्यापासुन 1846, 05234, 68A बोरॉन या विमांती काळान फवारणी घेतल्या शंभर दिवस झाडांना विमांती मिळी. तरीसुद्धा मनावी अशी पाणगळ साली नाही म्हणुन 1.3 लीटर पाण्यासाठी 5ग्रामिली इथ्रेल व 3g यार्बुरिया फवारणी घेतली. हि फवारणी घेउनसुद्धा बऱ्यापैकी पाणगळ साली नव्हती म्हणुन पुन्हा आठवड्याने प्रति लीटर 3 मिली इथ्रेल व 3 ग्राम यार्बुरिया फवारणी घेतली व 90% पाणगळ साली.

पुढील पानावर ①

Shubham

पाठागळ आल्यानंतर लगेच रासायनिक खतांचा भ्रसळ डोस प्रति ३५५ १५५ व २ पाटी शेताखत प्रति रोपास व ५ मेला पहिले पाणी सोडले. पहिल्या पाण्याबरोबर ५५ मायक्रोन्युन दिले. २२ मे ला प्रत्येक झाडाला ३०० ते ३५० कळी लागली. कळी लागल्यानंतर १ जुनपासुन दररोज पावसाला सुरुवात आली. रिमझिम पाऊस महिनाभर चालला त्यामुळे खालुन कोणतेही खते सोडली नाहीत.

तरीसुद्धा प्रत्येक झाडाला २०० ते ३०० फळे सेटिंग आली. सेटिंग आलेली फळे १ महिना पाऊस असुन अत्यल्प प्रमाणात रोगाचा प्रादुर्भाव जाणवला. डांब्या, खरड्या, लेव्या, कुजवा हे कोणतेही रोग १ महिना पाऊस चालु असुन फळावरती आला नाही. आवड्याला बुरशीमाशक व ङिळनाशक फवारण्या केल्या. मला यालुन अस जाणवला लवंग पाऊस असुनसुद्धा फळाची गळती आली नाही, फुलांची १०% प्रमाणात गळती आली. याच वातावरणामध्ये भाड्या जवळील भगव्याच्या बागा डांब्या, लेव्या, खरड्या, कुजवा या रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या. भगव्या वागाची ज्या शेतकऱ्यांची बाग आहे, ते एम्सएस सोलापुर लाल प्लॉटवर आल्यानंतर त्यांचे शेतकऱ्यांची मते असे आले की, आमच्या बागेवरती लवंग डांब्या, खरड्या, लेव्या कुजवा आला असुन तुमच्या बागेवरती या रोगांचा प्रादुर्भाव कसा काय दिसत नाही.


त्यांची मते अशी आली की सोलापुर लाल या वागाच्या झाडांची रोग प्रतिकार जाकली चांगली आहे व झाडांची फळ सेटिंग चांगली आहे. लवंगी २०० ते ३०० फळ सेटिंग पहिल्या वर्षी होत नाही. व कोणत्याही फवारण्या फळ सेटिंगलाही घेतल्या नाहीत. तरीदेखील २०० ते ३०० फळ सेटिंग आली. सेटिंग आल्यानंतर प्रत्येक झाडावरची १०० फळ काढुन टाकली. प्रत्येक झाडास १५० ते २०० फळे राहिली, परत १ महिना आल्यानंतर प्रत्येक झाडावरती १२५ ते १५० फळे देवली. भगव्या वागाची ज्या शेतकऱ्यांची बाग आहे त्स ते प्लॉट वरती आल्यानंतर तीन महिन्यांची फळे आली होती. फळांना क्लर येणु लागला होता त्यांची मते अशी आली की, फळांना चकाकी व चमक आहे.

पुढील पानावर... ②

Shubham

चार महिन्यांची फळे आल्यानंतर फळांच्या हाण्याचा रंग लाल हिंदु लालगा, व ते हाणे आल्यानंतर कडकपणा जाणवला. व तेच फळ काढणी ला आल्यानंतर हाण्याचा रंग पुढे गडद लाल झाला व हाणे आण्यासाठी मऊ लागले. त्यात कडकपणा जाणवला नाही. कलर व चमक भगव्या वा वाणापेक्षा थुप चांगली आहे. तसेच आकार छोटा असलेल्या फळांचा वजनदारपणा जास्त आहे.

यातून मला असा अनुभव आला की भगव्या वाणापेक्षा सोलापुर लाल या वाणा चांगली आहे. योडी सार्जि हण्यासाठी सोलापुर लाल त्रासदायक ठरतोच. पण तरीदेखील प्रति फळ 500७ निगम्यासाठी कोणतेही अडचण येणार नाही असे मला वाटते. भगव्यापेक्षा योडी सोलापुर लाल या वाणाची सार्जि कमीच राहणार असे मला वाटते कारण भगव्यापेक्षा सोलापुर लाल या वाणाची फळे महिना अगोदर काढीस येतात. सोलापुर लालची भगव्यापेक्षा साल भगव्यापेक्षा जाड आहे. व झाडाची पाने मोठी आहेत. व झाडाचा आकारमान मोठा आहे. व पाने हेल वारर ससे सोलापुर लाल मध्ये येणार नाही असे माझे वैयक्तिक मत आहे. तसेच झाडात मजवुनपणा, कारकपणा जास्त आहे. त्यामुळे फळांचा रस खोखा पेलतो. फळांची साल जाड असल्यामुळे तेलकट व जवऱ्याचे प्रमाण कमी येते. असे माझे मत आहे. कार्याची सल्ला जास्त असल्यामुळे फुलधारणा सेटिंग जास्त होते.


आपला विदास
केशव रमेश शायकवाड

(3)